

**KILLS THE
ROOT**

MONEY BACK GUARANTEE†

25% More THAN 32 FL OZ
CONCENTRATE

Kills Listed Weeds
NOT The Lawn*

Spectracide®

**WEED STOP®
FOR LAWNS**

Plus CRABGRASS KILLER

CONCENTRATE

Herbida concentrado para céspedes y contra mano de cangrejo

Kills **470+** Weed
Types As Listed

Visible Results
In **5** Hours

Kills Yellow Nutsedge

For Best Results, Apply When Temperature Is Between 45°F–90°F

ACTIVE INGREDIENTS:
2,4-D, dimethylamine salt..... 3.74%
Quinclorac..... 1.79%
Dicamba, dimethylamine salt..... 0.43%
Sulfentrazone..... 0.22%
OTHER INGREDIENTS..... 93.82%
TOTAL 100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS: 0.264 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 3.11%; 0.152 lb 3,7-dichloro-8-quinolinecarboxylic acid per gallon or 1.79%; 0.030 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 0.36%; 0.019 lb N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methane-sulfonamide per gallon or 0.22%. Isomer Specific by AOAC Method.

17-19332

**MIX WITH
WATER**

†For terms of guarantee, see back panel.
*When used as directed

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
Precautionary Statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para
conocer las declaraciones preventivas adicionales.

**Net Contents 40 fl oz
(1 qt 8 fl oz / 1.18 L)**

- césped.
- Vierta el producto en la jarra del rociador hasta el nivel necesario de "onza líquida".
- Agregue la cantidad apropiada de agua hasta el nivel de "galones". Vuelva a poner la tapa del rociador en la jarra y agite bien antes de rociar.
- Conecte el rociador a la manguera. Extienda la manguera hasta el lugar de césped a tratar que se encuentre más alejado y retroceda hacia el grifo mientras lo aplica de modo de no caminar sobre las zonas tratadas. Aplique uniformemente sobre el césped.

Tabla 3.

Área de tratamiento, pies cuadrados	Pasto azul de Kentucky, especies de festuca, ryegrass perenne, zoysia**, césped Bermuda*** y buffalograss	Marca de galón/nivel en la jarra del rociador
1,250 pies cuadrados	8 onz. liq.	3 gal.
1,875 pies cuadrados	12 onz. liq.	5 gal.
2,500 pies cuadrados	16 onz. liq.	6 gal.
3,750 pies cuadrados	24 onz. liq.	9 gal.

***No lo aplique al césped zoysia recién saliendo de inactividad, ya que puede causar daño al césped.

***La aplicación al césped Bermuda puede causar amarillamiento o descoloración temporal, pero se puede esperar una recuperación total. No lo aplique al césped Bermuda cuando las temperaturas diurnas sean superiores a los 90°F.

Ejemplo para pasto azul de Kentucky: Para tratar 3,750 pies cuadrados de césped, vierta 24 onz. liq. de producto en la jarra del rociador. Agregue agua hasta la marca de 9 gal. y aplique de manera uniforme en 3,750 pies cuadrados de césped. Para más detalles sobre el uso apropiado de su rociador, revise las indicaciones que recibió al comprarlo.

CONSEJOS SOBRE EL USO

- Las condiciones ambientales templadas y de humedad adecuada mejoran el rendimiento de este producto. Las aplicaciones se deberán llevar a cabo en malezas que se encuentran en la etapa de desarrollo activo. Aplique cuando las temperaturas diurnas se encuentren entre 45°F y 90°F. Evite aplicar este producto cuando los céspedes estén sometidos a estrés ya que puede ocasionar daño.
- Para zonas recién sembradas:** No lo aplique en el plazo de cuatro semanas después de la germinación de las plantas de semillero de pasto azul de Kentucky, mezclas de festuca de hoja fina y ryegrass perenne. Aplique este producto a céspedes recién cultivados cuando estén bien establecidos (aproximadamente seis semanas después de la germinación de las plantas de semillero) o después del tercer corte.
- Para zonas recién cubiertas de césped, de propagación vegetativa ("sprigging") o con "plugs":** La aplicación de este producto a pastos recién cubiertos, de propagación vegetativa ("sprigging") o con "plugs" se debe demorar hasta tres o cuatro semanas después de operaciones de cobertura de césped, propagación vegetativa o colocación de "plugs".
- Siembra:** Las especies de césped que se indican en esta etiqueta se pueden sembrar en las zonas tratadas cuatro semanas después de la aplicación de este producto.
- Irrigación:** No aplique este producto inmediatamente antes de la lluvia o el riego. Para obtener mejores resultados, no irrigue ni riegue el césped por 24 horas después de la aplicación. Si las condiciones son secas, se recomienda programar la irrigación o el riego 24 horas antes y 24 horas después de la aplicación.
- Corte:** Retrase el corte dos días antes y hasta dos días después de la aplicación de este producto. Más estrés ocasionado por la altura baja del corte puede aumentar la posibilidad del daño al césped. Los recortes de los primeros tres cortes se deben dejar en la zona tratada. No use los recortes provenientes de la zona tratada como mantillo ni abono orgánicos alrededor de flores, plantas ornamentales, árboles ni en huertos.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua ni los alimentos para personas o animales por medio del almacenamiento o la eliminación.

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego.

Eliminación del pesticida y manipulación del envase: Envase no reutilizable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Si está vacío: Tirelo en la basura y ofézcale para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

Spectracide

**WEED STOP FOR LAWNs
PLUS CRABGRASS KILLER
CONCENTRATE**

Herbicida concentrado para céspedes y control mano de carga

PEEL HERE
ABRA AQUÍ
RESEALABLE LABEL
ETIQUETA RESEALABLE

WHERE TO USE



Lawns – Treats
Bluegrass, Fescue,
Zoysia**, Bermuda***,
Perennial Ryegrass

WHEN TO USE

45°F
90°F

For best results, apply between 45°F-90°F.
Above 45°F, the better the weeds will be
able to absorb the product.
Lawn damage could happen above 90°F.

KILLS ALL TYPES OF LISTED BROADLEAF AND GRASSY WEEDS
Including Crabgrass, Dandelion, Chickweed, Clover & Yellow Nutsedge



Kills the Weeds Including
Crabgrass — Not the Lawn***
*When used as directed



Kills by
Contact



Treats up to
6,250 sq ft



Kills 470+ Weed
Types as Listed



Kills Weed
Roots

***Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected. Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

WHAT TO EXPECT

- EXPECTED VISUAL SYMPTOMS:** Leaves yellowing/browning, then curling, twisting, wilting and shriveling
- Visual symptoms and time to complete kill will depend on weed type, temperature and application rate**

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use in accordance with directions.

GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

QUESTIONS & COMMENTS: Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 96624 7

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-268-8845

EPA Est. No. 9688-MO-1 (U) 88964-G-1 (E) 58986-MO-1 (R)

Circled letter is first letter of lot number 17-20470

© 2024 United Industries Corporation. All Rights Reserved.

STOP! READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.
¡ALTO! LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

CONTROLS MOST COMMON WEEDS INCLUDING: / CONTROLA LA MAYORÍA DE LAS MALEZAS COMUNES, INCLUYENDO:

Alder	Blackberry	(Siberian yarrow)	Curlycup gumweed	Giant ragweed	Large crabgrass	Pennsylvania smartweed	Redwood sorrel	Spotted locoweed
Alfalfa (Lucerne)	Blackberry elder	Chinkapink oak	Cutleaf evening primrose	Gooseberry	(Hair crabgrass)	Peppermint (Perennial)	(Oregon oxalis)	(Freckled milkweed)
Alpine aster	Black-eyed Susan	Choke cherry	Daisy fleabane (annual)	Gray chickweed	Large flower pusley	peppercorn	Rough cinquefoil	Spotted spurge
Alsike clover	Blackseed plantain	Coffeebean	Dayflower	(Gray mouse-ear chickweed)	Late goldenrod	Pink oak (Swamp)	Rough fleabane	Spreading horseshoe
Alyce clover	Blessed thistle	Coffeedance (Colorado river hemp)	Dead nettle	Gray thistle	(Canada goldenrod)	Spanish oak	Rough horsetail	Stick Johnsonwort
American black elderberry	Bloodflower (Tropical milkweed, Mexican butterfly weed)	Common burdock	Dewberry (Garden dewberry)	Great burdock	Leafy spurge	Pinappleweed	(Scouringrush horsetail)	Sticky chickweed
American elm (White elm)	Blue ash	Common cinquefoil	Dichondra (Carolina poysofent)	Great ironweed	Leafy thistle	Pineywoods bedstraw	Russian pigweed	(Sticky mouse-ear chickweed)
American hazel	Blue elderberry	Common cocklebur	(Oldfield cinquefoil)	Great yellow woodsoorrel	Little bittercress	(Wood bedstraw)	Russian thistle	Stiff goldenrod
American persimmon	Blue lettuce	(Rough cocklebur, Large cocklebur)	Distaff thistle	Ground ivy	Little evening primrose	Plains coreopsis (tickseed)	Sage	(Stiff-leaved goldenrod)
(Common persimmon)	Blue mustard	Dogbane	Dogbane	(Creeping Charlie, Creeping Jenny)	Little mallow	Plantain (Broadleaf plantain, Greater plantain, Common plantain)	Saltcedar	Strawberry clover
(American Speedwell)	Blue toadflax	Dogfennel	Dogfennel	Groundsel	(Least mallow)	Sassafras (White sassafras, plantain)	Sassafras (White sassafras, Red sassafras, Silky sassafras)	Swamp smartweed
(American brooklime)	Blue vervain	Common dandelion	Dollarweed	Hackberry	Locust	Platte thistle	Scarlet pimpernel	Sweet goldenrod
American yellowrocket	Blue woodsoorrel	Common groundsel	(Manyflower marshpennywort)	Hairy beggaricks	London rocket	Plumless thistle	Scotch broom	(American sweetgum)
Amur honeysuckle	Blunt-leaved milkweed	Common hawkweed	Doveweed	Hairy bittercress	Mackenzie willow	Poison henlock	Scotch thistle	Swinecress
Annual knawel (German knotweed)	(Clasping milkweed)	Common hawthorn	Hairy fleabane	Hairy buttercup	Madrone	Poison ivy	(Cotton thistle)	Tall beggaricks
Annual nettle (Dwarf nettle)	Box elder	Common honeysuckle	Elk thistle	Hairy galinsoga	Marcela	Poison sumac	Shepherd's purse	Tall milkweed
Annual rape (Wild rape)	Bracted plantain	(Woodbine)	English daisy	Hairy vetch	Marshelder	Pokeweed	Scouler's willow	(Poke milkweed)
Annual sowthistle	Brazils buttes	Common knapweed	Eucalyptus	(Fodder vetch, Winter vetch)	Matchweed	Port Orford cedar (Lawson cypress)	Shiny cudweed	(Common morning glory)
(Common sowthistle, Milk sowthistle)	Brazil pusley	Common knotgrass	(Blue-gum, Tasmanian blue-gum, Southern blue-gum)	Hairy-pitted stork's bill	Meadow hawkweed	Povertyweed	Shortawn foxtail (Orange foxtail)	Tall thistle
Annual trampweed	Bristly malow	Common lespedeza	Evergreen blackberry	Heartleaf drymary	Meadow thistle	Prairie sunflower	Shorstalk stinkweed	Tall vervain
(Spotted geranium, Wound geranium, Cranesbill)	Bristly oxtonge	Common lupine	Heartleaf nettle	Heartleaf nettle	Mesquite (Honey mesquite)	Prickly lettuce (Compass plant)	Showy evening primrose	Tanock (Tanbark- oak)
Annual yellow sweet clover	Broadleaf knotweed	Common mallow	Heartleaf nettle	Heath aster (White heath aster)	Mexican morning glory	Prickly sida	Showy goldenrod	Tansy ragwort
Arkansas rose	Broad-leaved dock	(Alkali mallow, Buckwheat, Dwarf mallow)	False flax	Hedge mustard	Mexicanweed	Prostrate knotweed	(Canadian tick-trefoil, Canada tickclover)	Tansyweed
Artichoke thistle	Broomweed	Common mullein	Fennel	Hemp	Mimosa	Prostrate pigweed	Silver pignut	(Water knotweed, Water smartweed)
Asiatic pennywort	Buckwheat	Common primrose	Field bindweed	Henbit	Mock strawberry	Prostrate spurge	(Silver nickel vine)	Teaweed
Asiatic witchweed	Bulbous buttercup	(English primrose)	(Moring glory, Creeping Jenny)	Himalayan blackberry	Mojave stinkweed	Prostrate verbain	Slender amaranth	Texas filaree
Atlantic white cedar	Burnt nettle	Common purslane	Field burweed (Lawn burweed, Common solva, Spurweed)	Hoary cross	Mountain bush honeysuckle	Puncture vine	Slender bush clover	Thimbleberry
(Southern white cedar)	(Stinging nettle)	Common ragweed	Field horsetail	Hoary plantain	Mountain woodsoorrel	(Goat's-head)	(Slender lespedeza)	Three flower beggarweed
Austrian fieldcress	Burnt nettle	Common salsify	(Common horsetail, Mare's tail)	Hoary vernal	Mouse-ear chickweed	Purple aster	Purple cudweed (Annual purple cudweed, Perennial purple cudweed)	Thymeleaf speedwell
Ball mustard	Bushy aster	Common snowberry	Field mouse-ear (Field chickweed)	Hop clover	Mouse-ear hawkweed	Purple aster	Slender speedwell	Toadflax (Common toadflax, Yellow toadflax)
Bedstraw	Bushy butterweed	Common speedwell	Field oxe-eye-daisy	Horsenettle	Mugwort	Purple deadnettle	Slender stinkweed	Tooth-leaved croton
Beggarweed (Creeping beggarweed)	(Rough buttonweed, Poorjee)	Common sunflower	(Creeping oxe-eye, Oxe-eye daisy)	Horse radish	Multiflora rose	Purple milkchick	Slender flower thistle	(Tropic croton, Sand croton)
Big leaf maple	California knotweed	Common tarweed	Field pansy	Horseweed/marestail	Musk thistle	Purple milkweed	Smallflowered thistle	Trailing blackberry
Bigroot morning glory	California woodsoorrel (Yellow woodsoorrel, Common yellow oxalis)	Common yellow woodsoorrel (Yellow woodsoorrel, Common yellow oxalis)	Field pennycress	Illinois woodsoorrel	Narrow leaved willow	Purple milkweed	Smooth bedstraw	Trailing crownvetch
Bigtooth aspen	Canada thistle	Field pennycress	(French weed)	Indian mock strawberry	Narrowleaved willow	Purple milkweed	(Crosswort)	Tree tobacco
(American aspen, White poplar)	Carolina geranium (wild)	Field pepperweed	Italian thistle	Innocence (Blue-eyed Mary)	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Trumpet creeper
Bi-lobed speedwell	Carpelweed	Field pepperwort	lyleaf morning glory	Italian thistle	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	(Trumpet vine, Cow ich vine)
(Twolobe speedwell)	Catchweed	Field violet	lyleaf speedwell	Japanese honeysuckle	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Hummingbird vine)
Bindweed (Wild morning glory)	Catchweed bedstraw	Field woods plum	Japanese honeysuckle	Jewel milkweed (Pallid milkweed)	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Tufted evening primrose
Bird vetch	Catchweed bedstraw	Com spurry	Japanese honeysuckle	Jewel milkweed (Pallid milkweed)	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	(Evering primrose)
Bird sneezeweed	Catchweed bedstraw	Coyote bush	Jewelweed	Jewelweed	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	(Fragrant evening primrose)
Bitterweed	Catscar	Creeping buttercup	Jimsonweed, devil's snare	Jimsonweed, devil's snare	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	(Fragrant evening primrose)
Black bent (Redtop)	False dandelion	Creeping woodsoorrel	Florida betony	Johnny-jumpup violet	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Tufted knotweed
Black birch (River birch, Water birch)	Spotted and Common catscar	Crimson clover	Florida prickly blackberry	Kutzu	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Tumble mustweed
Black cherry	Spotted and Common catscar	Cudweed (Purple cudweed)	Florida yellow woodsoorrel	Ladythumb smartweed	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Velvetleaf
Black cottonwood	Chamber bitter	Cupid shaving brush	Florida broom	Lamb's quarters	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vine mallow
Black medick	Chamise	(Curled dock, Yellow dock, Sour dock)	Garden spurge	Goosefoot, Pigweed	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vetch (Common vetch, Garden vetch)
Black mustard	Chickweed (Common chickweed)	Curly dock (Sensitive jointvetch)	Garden star-of-Bethlehem	Lambsquarters	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vine mallow
Black willow	Chicory	Curly dock (Sensitive jointvetch)	(Grass lady)	Lanceleaf ragweed	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vine mallow
	Chinese yarrow		Garlic mustard	Lantana	Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vine mallow
			Giant ironweed		Narrowleafed plantain	Purple milkweed	Smooth chaff-flower	Vine mallow

Virginia creeper	White sweet clover	Wild rose	Wrinkleleaf goldenrod
Virginia pepperweed	(White melilot)	(Prickly wild rose)	(Roughstemmed goldenrod)
(Peppergrass)	Whitestem filaree	Wild strawberry	Yarrow (Common yarrow)
Virginia winged rockcress	White top	Wild sweet potato	Yellow birch
Wandering cutweed	Wild blackberry	Wild yelch	(Golden birch)
Water pennywort	(Thornless blackberry)	Wild violet	Yellow rocket (Winter cress, Bitter wintercress, Wild mustard)
(Floating marshpennywort)	Wild buckwheat	Willow-leaved poplar (Narrowleaf cottonwood)	Yellow starthistle
Wayleaf thistle (Gray thistle)	Wild carrot	Wild cherry	Yellow sundrops
Western clematis	Wild four-o'clock	Wild garlic (Wild onion)	(Shrubby evening primrose)
Western ragweed	Wild honeysuckle	(Tartarian honeysuckle)	Yellow sweet clover
Western salisfly (Goatsbeard)	Wild lettuce	Wild marigold	(Yellow melilot, Ribbed melilot, Common melilot)
White ash (American ash)	Wild marigold	(Roundleaf marigold, Southern marigold)	Yellow thistle (horrible)
White clover	Wild morning glory	(Hedge bindweed)	Yellowflower pepperweed
(Dutch clover, Honeysuckle clover, White trefoil, Purplewort)	Wild plum (American plum)	White mustard	Wormseed
White prairie aster	Wild radish	(Woodland goldenrod)	Wormseed mustard

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USING.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Harmful if swallowed. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.

Wash thoroughly with soap and water after handling. After using this product, rinse gloves before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower.

First Aid	
If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a Poison Control Center or doctor. • Do not give anything to an unconscious person.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-917-5438 for emergency medical treatment advice.	

Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

Physical and Chemical Hazards • Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For outdoor residential use only.

Restrictions

Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. **Do not** allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried. **Do not** treat when air temperatures exceed 90°F, as damage to grass may occur. Application at rates above specified on this label may cause injury to turfgrass. **Do not** apply this product to food crops (gardens and vegetables), forage crops or ornamental plants including flowers, trees, shrubs, hedges, woody ornamentals, groundcovers established in

landscape plantings and other non-target plants. **Do not** spray exposed roots of ornamentals and trees.

Do not use Spectracide® Weed Stop® Plus Crabgrass Killer Concentrate on lawns containing bentgrass, St. Augustinegrass, bahiagrass, centipedegrass or carpetgrass. Also, do not use on dichondra or lawns with desirable clovers or legumes. Do not use on vegetable gardens, fruits or ornamentals (flowers, trees, groundcovers, hedges, landscape/flower beds and shrubs).

WHERE TO USE

This product is intended for use by homeowners on residential lawns. Only apply this product to the following species of turfgrass:

Cool season turfgrasses: Kentucky bluegrass; perennial ryegrass; fescue spp., including tall, red and fine leaf fescues.

Warm season turfgrasses: zoysiagrass**, Bermudagrass***, buffalograss

**Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy, as it may result in lawn damage.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected.

Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

WHEN TO USE¹

Apply when daytime temperatures are between 45°F and 90°F.

SPRING: Spray when broadleaf weeds are young and actively growing with adequate soil moisture for best results. **FALL:** Spray when broadleaf weeds are young and actively growing with adequate soil moisture for best results. Fall applications will control weeds that may otherwise go dormant through the winter and resprout the following spring. For heavy grass weed pressure, apply a second application at the same rate, 14 days after the first application.

CRABGRASS (LARGE AND SMOOTH): • **Spring and early summer:** For the best results, apply this product from crabgrass emergence until the six-leaf stage (two tillers) or before the crabgrass is 3 to 4 inches tall. This period begins the first time that you can see crabgrass in your lawn. Use two applications at the same rate with a 14-day interval for dense populations.

FOXTAIL (GREEN, GIANT AND YELLOW):

Spring and early summer: For the best results, apply this product to foxtail during the early growth stages or when foxtail is 1 to 4 inches tall. Use two applications at the same rate with a 14-day interval for dense populations.

YELLOW NUTSEDGE:

Early summer: two applications of this product are required when the yellow nutsedge plants are 3 to 6 inches tall. Apply the second application at the same rate 14 days later.

BROADLEAF WEEDS:

Spring: Apply when dandelion, plantain, buttercup, speedwell, knotweed and other broadleaf weeds are young and actively growing with adequate soil moisture for best results.

Fall: Apply when henbit, chickweed, white clover, ground ivy, lawn burweed and other broadleaf weeds are young and actively growing with adequate soil moisture for best results.

²Visual symptoms and time to kill will depend on weed type, temperature and application rate.

HOW MUCH TO USE

See the following table for calculating the correct amount of product to use for the area to be treated.

The maximum application rate is 6.5 fl oz of product per 1,000 sq ft per application (0.6 lb 2,4-D acid equivalent, 0.34 lb Quinclorac, 0.07 lb of Dicamba acid equivalent and 0.04 lb of Sulfentrazone per acre per application).

The maximum number of broadcast applications is limited to two per year.

The maximum seasonal rate is 13.0 fl oz. of product per 1,000 sq ft (1.2 lb 2,4-D acid equivalent, 0.67 lb Quinclorac, 0.13 lb of Dicamba acid equivalent and 0.08 lb of Sulfentrazone per acre), excluding spot treatments.

MEASUREMENT CALCULATIONS: Total lawn area in square feet = length x width.

EQUAL MEASURES:

1 fl oz = 2 Tbsp = 6 tsp

4 fl oz = ½ cup

16 fl oz = 1 qt

2 fl oz = 4 Tbsp

8 fl oz = 1 cup

32 fl oz = 1 qt

SPOT TREATMENT

To treat small areas or individual weeds, use a pressure sprayer for better control. Do not use a hose-end sprayer for spot treatments. Mix the indicated amount of product listed below with 1 gal of water for each 500 sq ft to be treated. Shake well before spraying. Spray the target weeds thoroughly. Nozzle adjustments may be necessary to deliver small spray droplets on the target weeds for uniform coverage.

Amount of product to be diluted in 1 gal water required to treat 500 sq ft of lawn with pressure sprayers:

Turfgrass	Amount of product fl oz (Tbsp)
Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, zoysiagrass**, Bermudagrass*** and buffalograss	5 fl oz or 10 Tbsp

**Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy, as it may result in lawn damage.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected.

Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

ENTIRE LABEL TREATMENTS

Three easy steps to mix and apply with hand-operated sprayers:

1. Calculate the total lawn area to be treated. This is done by multiplying the length of the area by the width to obtain total square feet. Prepare only enough spray solution to treat the area calculated.
2. Prepare the spray mixture according to Table 1. Carefully measure the proper amount of product to treat 1,000 sq ft. If more or less than 1,000 sq ft is to be treated, adjust the amount of product accordingly.
3. Shake the spray solution before and during application. Use a spray pattern that gives small droplets without any fine mist.

BROADCAST TREATMENTS:

PRESSURE SPRAYERS

Table 1. Amount of product to be diluted in 1 gal of water required to treat 1,000 sq ft of lawn with pressure sprayers:

Turfgrass	Amount of product
Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, zoysiagrass**, Bermudagrass*** and buffalograss	6.4 fl oz

**Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy, as it may result in lawn damage.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected.

Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

DIAL-IN HOSE-END SPRAYERS WITH NO PRE-MIXING

1. From Table 2 below, determine amount of product to be applied for each 1,000 sq ft of lawn.
2. Fill sprayer jar with enough concentrate to cover area to be treated. DO NOT add water to the sprayer jar.
3. Set dial on sprayer to the "Rate per Gallon" setting from Table 2 below.
4. Attach sprayer to garden hose. Extend hose to the farthest area of lawn to be treated and work back toward faucet so that you do not walk over treated areas. Apply evenly to lawn.
5. Unused product can be returned to the original container when completed.

Turfgrass	Rate per gallon	Amount of product applied per 1,000 sq ft**
Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, zoysiagrass**, Bermudagrass*** and buffalograss	5 Tbsp or 15 tsp or 2.5 fl oz	6.4 fl oz

**Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy, as it may result in lawn damage.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected.

Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

≈This assumes the sprayer delivers approximately 2.5 gal per 1,000 sq ft sprayed.

EXAMPLE: For Kentucky bluegrass: To treat 3,000 sq ft of lawn, measure 20 fl oz of product into sprayer jar. Do not add water. **Set dial on 5 Tbsp or 15 tsp** and apply uniformly on 3,000 sq ft of turfgrass.

Check the directions you received when you purchased your sprayer for further details on the proper use of your sprayer. Directions are calculated assuming hose-end sprayer is used to spray about 2 gal of water/product mixture per 1,000 sq ft.

FOR CONCENTRATE-PLUS-WATER SPRAYERS OR HOSE-END SPRAYERS WITH PRE-MIXING

For sprayers that require the addition of water as well as concentrate prior to application:

1. From Table 3 below, determine amount of product to be applied for each 1,000 sq ft of lawn.
2. Pour product into sprayer jar to the required "fl oz." level.
3. Add the appropriate amount of water to the "gallons" level. Replace sprayer top on jar and shake well before spraying.
4. Attach sprayer to hose. Extend hose to the farthest area of lawn to be treated and work back toward faucet so that you do not walk over treated areas. Apply evenly to lawn.

Area to be treated, sq ft	Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, zoysiagrass**, Bermudagrass*** and buffalograss	Gallon mark/level on sprayer jar
1,250 sq ft	8 fl oz	3 gal
1,875 sq ft	12 fl oz	5 gal
2,500 sq ft	16 fl oz	6 gal
3,750 sq ft	24 fl oz	9 gal

**Do not apply to zoysiagrass just emerging from dormancy, as it may result in lawn damage.

***Application to Bermudagrass may cause temporary yellowing or discoloration, but full recovery can be expected.

Do not apply to Bermudagrass when daytime temperatures exceed 90°F.

Example for Kentucky bluegrass: To treat 3,750 sq ft of lawn, pour 24 fl oz of product into sprayer jar. Add water to the 9 gal mark and apply uniformly on 3,750 sq ft of turfgrass.

Check the directions you received when you purchased your sprayer for further details on the proper use of your sprayer.

USE TIPS

- Adequate moisture and mild environmental conditions enhance the performance of this product. Applications should be made to actively growing weeds. Apply when daytime temperatures are between 40°F and 90°F. Avoid applications of this product when turfgrasses are under stress since injury may result.
- For newly seeded areas: Do not apply within four weeks after seedling emergence of Kentucky bluegrass, fine fescue blends and perennial ryegrass. Apply this product to newly seeded grasses when well-established (approximately six weeks after seedling emergence) or after the third mowing.
- For newly sodded, sprigged or plugged areas: The application of this product to newly sodded, sprigged or plugged grasses should be delayed until three to four weeks after the sodding, sprigging or plugging operations.
- Seeding: Turf species listed on this label can be seeded into the treated areas at four weeks after the application of this product.
- Irrigation: Do not apply this product immediately before rainfall or irrigation. For best results, do not irrigate or water the turfgrass within 24 hours after application. If dry conditions exist, a scheduled irrigation or watering 24 hours before and 24 hours after application is recommended.
- Mowing: Delay mowing two days before and until two days after the application of this product. Additional stress from low mowing heights may increase the possibility of turf injury. Clippings from the first three mowings should be left on the treated area. Do not use clippings from the treated areas as mulch or compost around flowers, ornamentals or trees or in vegetable gardens.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

Pesticide Storage: Store in a cool, dry area away from heat or open flame.

Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or other for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Noctivo si se ingiere. Cuando use este producto, use camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines, zapatos y guantes de goma/hule.

Después de manipularlo, lávese muy bien con jabón y agua. Luego de utilizar este producto, enjuague los guantes antes de quitárselos, quítese la ropa y lávela por separado antes de volver a usarla y rápidamente lávese muy bien las manos y la piel que estuvo expuesta con agua y jabón. Quítese la ropa mojada y báñese en regadera tan pronto como sea posible.

	Primeros auxilios
Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. • Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros cinco minutos, luego continúe enjuagando los ojos. • Lleve a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Si se ingiere:	• Lleve inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. • No permita beber tragos. Haga que beba poco a poco un vaso de agua. • No induzca el vómito a menos que se le indique un centro de control de envenenamientos o un médico. • No administre nada a una persona que haya perdido el conocimiento.
Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al: 1-800-917-5438 para recibir instrucciones de tratamiento médico de urgencia.	

Riesgos para el medio ambiente

Este pesticida es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. El arrastre y el escurrimiento pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las aguas cercanas al sitio de aplicación. Para evitar el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni arroyos naturales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas; ayude a asegurar que el viento no lo lleve al arroyo cercano o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayude a evitar el arrastre a masas de agua o sistemas de drenaje.

Riesgos físicos y químicos

Combustible. No lo use ni almacene cerca de una fuente de calor ni del fuego.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

Solo para uso residencial en espacios exteriores.

Restricciones

No aplique este producto de modo que entre en contacto con cualquier persona o mascota, ya sea directamente o por arrastre. Mantenga a las personas y las mascotas fuera de la zona durante la aplicación. No permita que las personas ni las mascotas entren en la zona tratada hasta que los rocíos se hayan secado. No trate cuando la temperatura del aire sea superior a 90°F porque se puede dañar el césped. La aplicación de dosis superiores a las que se especifican en esta etiqueta puede causar daño al césped. No aplique este producto a cultivos de alimentos (jardines y hortalizas), cultivos de forraje ni plantas ornamentales, incluyendo flores, árboles, arbustos, setos, plantas ornamentales, cubiertas de suelo establecidas en plantaciones ornamentales y otras plantas que no sean el objetivo. No rocíe las raíces expuestas de árboles y plantas ornamentales.

No use el Herbicida concentrado para céspedes y contra mano el producto Quicrop Spectracide® Weed Stop® en céspedes que contengan agrostis, pasto San Agustín, bahiaguas, clematis o césped alfombra. Además, no lo use en diondria ni en céspedes con tréboles o legumbres deseados. No lo use en huertos, frutas o plantas ornamentales (flores, árboles, cobertura de suelos, setos, jardines/techos de flores y arbustos).

DÓNDE USAR

Este producto está diseñado para uso de los propietarios en céspedes residenciales. Aplique este producto únicamente a las siguientes especies de céspedes:

Césped de clima frío: pasto azul de Kentucky; ryegrass perenne; especies de festuca, incluyendo alta, roja y de hoja fina.

Césped de clima cálido: zoysia™, césped Bermuda™, buffalograss

***No lo aplique al césped zoysia recién saliendo de inactividad, ya que puede causar daño al césped.

***La aplicación al césped Bermuda puede causar amarillamiento o decoloración temporal, pero se puede esperar una recuperación total. No lo aplique al césped Bermuda cuando las temperaturas diurnas sean superiores a los 90°F.

CUÁNDO USAR

Aplique cuando las temperaturas diurnas se encuentren entre 45°F y 90°F.

PRIMAVERA: Para obtener mejores resultados, rocíe cuando las malezas de hoja ancha son jóvenes y están en crecimiento activo con la humedad de suelo adecuada.

OTOÑO: Para obtener mejores resultados, rocíe cuando las malezas de hoja ancha son jóvenes y están en crecimiento activo con la humedad de suelo adecuada. Las aplicaciones en otoño controlarán las malezas que, de otra manera, podrían pasar inactivas en invierno y volver a brotar en la primavera siguiente. Si hay muchas malezas herbáceas, haga una segunda aplicación con la misma dosis, 14 días después de la primera aplicación.

MANO DE CANGREJO (GRANDE Y SUAVE): • Primavera y principios del verano: Para obtener mejores resultados, aplique este producto desde la emergencia del césped mano de cangrejo hasta la etapa de seis hojas (dos retornos) o antes de que el césped mano de cangrejo tenga de 3 a 4 pulgadas de altura. Este periodo comienza la primera vez que usted observa mano de cangrejo en su césped. Haga dos aplicaciones con la misma dosis con un intervalo de 14 días para poblaciones densas.

COLA DE ZORRO (VERDE, GIGANTE Y AMARILLO):

Primavera y principios del verano: Para obtener mejores resultados, aplique este producto a la cola de zorro durante las etapas de crecimiento inicial cuando la planta tenga de 1 a 4 pulgadas de altura. Haga dos aplicaciones con la misma dosis con un intervalo de 14 días para poblaciones densas.

CYPERUS ESCULENTUS (JUNCIA AVELLANADA):

Principios del verano: Se necesitan dos aplicaciones de este producto cuando las plantas de juncia avelanada tienen de 3 a 6 pulgadas de altura. Realice la segunda aplicación con la misma dosis 14 días después.

MALEZAS DE HOJA ANCHA:

Primavera: Para obtener mejores resultados, aplique cuando el diente de león, llantén, ranunculo, veronica, polígono y otras malezas de hoja ancha son jóvenes y están en crecimiento activo con la humedad de suelo adecuada.

Otño: Para obtener mejores resultados, aplique cuando la origina masca, pampala, trébol blanco, hiedra terrestre, Soliva sessilis y otras malezas de hoja ancha son jóvenes y están en crecimiento activo con la humedad de suelo adecuada.

***Las señales visuales y el tiempo que tarda la eliminación dependerá del tipo de maleza, la temperatura y la dosis de aplicación.

CUÁNTO USAR

Vea la siguiente tabla para calcular la cantidad correcta de producto que debe usar para la zona a tratar.

Las dosis máximas de aplicación de este producto son de 6.5 onzas de producto por cada 1,000 pies cuadrados aplicados (0.6 lb de equivalente ácido de 2.4-D, 0.34 lb de Quinclorac, 0.07 lb de equivalente ácido de dicamba y 0.04 lb de sulfentrazone por acre por aplicación).

La cantidad máxima de aplicaciones al voleo está limitada a dos por año.

La dosis máxima por temporada es de 13.0 onzas líquidas de producto por cada 1,000 pies cuadrados (1.2 lb de equivalente ácido de 2.4-D, 0.67 lb de Quinclorac, 0.13 lb de equivalente ácido de dicamba y 0.08 lb de sulfentrazone por acre), exluidos los tratamientos localizados.

CÁLCULOS DE MEDICIÓN: El área total del césped en pies cuadrados = largo x ancho.

EQUIVALENTES DE MEDIDAS:

1 onz. liq. = 2 ctsd. soperas = 6 cttas. 4 onz. liq. = 1 taza 16 onz. liq. = 1 pinta

2 onz. liq. = 4 ctsd. soperas 8 onz. liq. = 1 taza 32 onz. liq. = 1 cuarto de galón

TRATAMIENTO LOCALIZADO

Para lograr un mejor control, si trata zonas pequeñas o malezas individuales, use un rociador a presión. No use un rociador con aplicación para manguera para tratamientos localizados. Mezcle la cantidad indicada de producto mencionado a continuación con 1 gal. de agua por cada 500 pies cuadrados a tratar. Agite bien antes de rociar. Rocíe completamente las malezas que son el objetivo. Puede ser necesario ajustar la boquilla para rociar gotitas pequeñas sobre las malezas que son el objetivo para una cobertura uniforme.

Césped	Cantidad de producto en onz. liq. (clds. soperas)
Pasto azul de Kentucky, especies de festuca, ryegrass perenne, zoysia™, césped Bermuda™ y buffalograss	5 onz. liq. o 10 ctsd. soperas

***No lo aplique al césped zoysia recién saliendo de inactividad, ya que puede causar daño al césped.

***La aplicación al césped Bermuda puede causar amarillamiento o decoloración temporal, pero se puede esperar una recuperación total. No lo aplique al césped Bermuda cuando las temperaturas diurnas sean superiores a los 90°F.

TRATAMIENTOS PARA TODO EL CÉSPED

Tres pasos fáciles para mezclar y aplicar con rociadores manuales:

1. Calcule el área total del césped que se va a tratar. Para hacerlo, multiplique la longitud del área por el ancho para obtener el total de pies cuadrados. Prepare suficiente solución de rocio para tratar el área calculada.

2. Prepare la mezcla de rocio de acuerdo con la Tabla 1. Mida con cuidado la cantidad correcta de producto para tratar 1,000 pies cuadrados. Si va a tratar más o menos de 1,000 pies cuadrados, ajuste la cantidad de producto como corresponde.

3. Agite la solución de rocio antes y durante la aplicación. Use un tipo de rocio que descargue gotas pequeñas pero que no forme niebla fina.

TRATAMIENTOS AL VOLEO: ROCIADORES A PRESIÓN

Table 1. Cantidad de producto para diluir en 1 gal. de agua necesario para tratar 1,000 pies cuadrados de césped con rociadores a presión:

Césped	Cantidad de producto
Pasto azul de Kentucky, especies de festuca, ryegrass perenne, zoysia™, césped Bermuda™ y buffalograss	6.4 onz. liq.

***No lo aplique al césped zoysia recién saliendo de inactividad, ya que puede causar daño al césped.

***La aplicación al césped Bermuda puede causar amarillamiento o decoloración temporal, pero se puede esperar una recuperación total. No lo aplique al césped Bermuda cuando las temperaturas diurnas sean superiores a los 90°F.

ROCIADOR CON APLICADOR PARA MANGUERA CON SELECTOR SIN PREMEZCLADO

1. Utilizando la Tabla 2, determine la cantidad de producto que se debe aplicar por cada 1,000 pies cuadrados de césped.

2. Llene la jara del rociador con la cantidad de concentrado adecuada para cubrir la zona a ser tratada. No agregue agua a la jara del rociador.

3. Ajuste el selector en el rociador en la posición "Dosis por galón" que se indica en la Tabla 2 a continuación.

4. Conecte el rociador a la manguera de jardín. Extienda la manguera hasta el lugar de césped a tratar que se encuentre más alejado y retorcido hacia el grifo mientras lo aplica de modo de no caminar sobre las zonas tratadas. Aplique uniformemente sobre el césped.

5. El producto sin usar se puede regresar al envase original cuando termine.

Tabla 2.

Césped	Dosis por galón	Cantidad de producto aplicado por 1,000 pies cuadrados**
Pasto azul de Kentucky, especies de festuca, ryegrass perenne, zoysia™, césped Bermuda™ y buffalograss	5 ctsd. soperas o 15 cttas. o 2.5 onz. liq.	6.4 onz. liq.

***No lo aplique al césped zoysia recién saliendo de inactividad, ya que puede causar daño al césped.

***La aplicación al césped Bermuda puede causar amarillamiento o decoloración temporal, pero se puede esperar una recuperación total. No lo aplique al césped Bermuda cuando las temperaturas diurnas sean superiores a los 90°F.

**Esto supone que el rociador aplica aproximadamente 2.5 gal. por cada 1,000 pies cuadrados rociado.

EJEMPLO: para pasto azul de Kentucky: Para tratar 3,000 pies cuadrados de césped, mida 20 onz. liq. de producto en la jara del rociador. No agregue agua. **Ajuste el selector a 5 ctsd. soperas o 15 cttas.** y aplique de manera uniforme en 3,000 pies cuadrados de césped.

Para más detalles sobre el uso apropiado de su rociador con selector, revise las indicaciones que recibió al comprarlo. Las instrucciones se calculan suponiendo que se usa un rociador con selector tipo aplicador para rociar alrededor de 2 galones de agua/mezcla de producto por cada 1,000 pies cuadrados.

PARA ROCIADORES "CONCENTRADO MÁS AGUA" O ROCIADORES CON APLICADOR PARA MANGUERA CON EL PRODUCTO PREMEZCLADO

Para rociadores que requieren agregar agua junto al concentrado antes de la aplicación:

1. Utilizando la Tabla 3 a continuación, determine la cantidad de producto que se debe aplicar por cada 1,000 pies cuadrados de

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

Pesticide Storage: Store in a cool, dry area away from heat or open flame.

Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Harmful if swallowed. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.

Wash thoroughly with soap and water after handling. After using this product, rinse gloves before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower.

First Aid	
If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first five minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a Poison Control Center or doctor. • Do not give anything to an unconscious person.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-917-5438 for emergency medical treatment advice.	

Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

Physical and Chemical Hazards

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad por seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas y comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group

Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-268-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 89964-GA-1 (E), 58996-MO-1 (AE)

Circled letter is first letter of lot number. 17-20470 © 2024 United Industries Corporation.

All Rights Reserved.